

## AGGIORNAMENTO SULL'AVIFAUNA DELL'UMBRIA (AVES)

Stefano Laurenti, Andrea Maria Paci

**ABSTRACT** The authors update the checklist of birds in Umbria adding data collected between 1996 and 2002. Thirteen species are added to a previous list (six of them corresponding with unsuccessful introductions and escapes from captivity) and 26 phenological stati are modified. The following observations are particularly interesting: sighting of the Spur-winged Plover (*Hoplopterus spinosus*) and Paddyfield Warbler (*Acrocephalus agricola*), the second and the eleventh one in Italy, respectively, continuous colonization by the Cattle Egret (*Bubulcus ibis*), ascertained nesting of the Grey Heron (*Ardea cinerea*), Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*) and Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*), likely nesting of the Little Crake (*Porzana parva*) and Spectacled Warbler (*Sylvia conspicillata*) and overwintering of the Great Grey Shrike (*Lanius excubitor*).

**KEY WORDS** Aves, Umbria, Italy, updates

### INTRODUZIONE

Nel presente contributo vengono esposte le variazioni commentate alla checklist degli uccelli dell'Umbria (Laurenti et al., 1995), con l'inserimento di 13 nuove specie e la modifica di 26 stati fenologici.

### MATERIALI E METODI

Le notizie riportate negli aggiornamenti faunistici sono state ricavate da vari lavori pubblicati dal 1995 al dicembre 2002 oppure rappresentano dati inediti personali o gentilmente forniti da colleghi. La terminologia fenologica utilizzata è quella proposta da Bricchetti & Massa (1998):

B = Nidificante;

S = Sedentaria (sempre abbinato a B);

M = Migratrice;

W = Svernante;

A = Accidentale (es. A2 = Accidentale noto con due segnalazioni);

reg. = regolare (abbinato solo a M);

irr. = irregolare (abbinato a tutti i simboli);

? = può seguire ogni simbolo e indica dubbio;

( ) = status da confermare.

### RISULTATI

#### Elenco delle specie

#### Podicipedidae

*Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)

(Svasso collarosso) A4

Riportata in precedenza come A3. Un individuo è stato osservato nel lago Trasimeno nel settembre 2001 (Velatta, com. pers.).

#### Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773)

(Marangone minore) A1

Un individuo segnalato presso l'Oasi di Alviano (TR) nel febbraio 1999 (Laurenti, 1998).

#### Ardeidae

*Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)

(Airone guardabuoi) SB, M reg., W

Segnalata per la prima volta in Umbria nel 1996 presso il Lago Trasimeno (PG) dove, dal 2001, nidifica nella garzaia di Castiglione del Lago con almeno due coppie (Velatta, 2002; Velatta & Bencivenga, 2002; Velatta, com. pers.). Dal 2001 la specie è presente anche nelle campagne intorno a Città della Pieve (PG) (Convito, com. pers.) mentre in provincia di Terni singoli individui sono stati osservati dall'autunno 1998 (Laurenti, 1998) all'estate 2002, nell'Oasi di Alviano (TR) e territori limitrofi.

*Ardea cinerea* Linnaeus, 1758

(Airone cenerino) SB, M reg., W

Considerata in precedenza M reg., W, E, si riproduce dal 1999 presso la Palude di Colfiorito (PG), con una colonia di almeno dieci coppie concentrate all'interno del canneto (Bencivenga, 2001).

#### Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)

(Mignattaio) M reg., W irr.

Considerata in precedenza M reg. Un individuo ha sostato nell'Oasi di Alviano (TR) tra la seconda metà di novembre a quasi tutto dicembre 1998 (Laurenti, 1998). La presenza di un altro individuo è stata segnalata, ancora ad Alviano, fino alla terza settimana del dicembre 2002.

#### Phoenicopteridae

*Phoenicopus roseus* Linnaeus, 1758

(Fenicottero) M reg., W irr.

Riportata in precedenza come A2. Un individuo è stato osservato presso Montone (PG) nel novembre 1997 (Migliorati, com. pers.); quattro individui sono stati segnalati nel Lago Trasimeno (PG) il 27.III.1998 (Romano, com. pers.); 1-8 individui hanno sostato dall'ottobre 2001 al febbraio 2002 nell'Oasi di Alviano (TR).

#### **Anatidae**

*Cygnus olor* (Latham, 1790)  
(Cigno reale) SB, M reg., W

Considerata in precedenza M irr., W irr. (B). Dalla seconda metà degli anni '90 diversi esemplari svernano regolarmente e qualche coppia, probabilmente aufuga, si riproduce nell'Oasi di Alviano (TR), mentre nel lago Trasimeno (PG) e in alto Tevere umbro è sempre più frequente l'osservazione di individui, singoli o in piccoli gruppi, soprattutto durante la stagione fredda.

*Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770)  
(Moretta tabaccata) SB, M reg., W

Considerata in precedenza M reg., W, B (introdotta), con coppie liberate a scopo reintroduttivo nell'Oasi di Alviano (TR) in seno al Progetto Anatre del WWF Italia (Laurenti, 1995), è stata segnalata recentemente nel Lago Trasimeno (PG) durante il periodo riproduttivo, con individui osservati durante l'accoppiamento (Velatta, 2002).

*Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758)  
(Edredone) A1

Si ha notizia del rinvenimento di una femmina di questa specie avvenuto circa venticinque anni fa nel Lago Trasimeno (PG) (Bittoni & Mallone, com. pers.).

#### **Accipitridae**

*Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)  
(Falco di palude) M reg., B irr., W

Considerata in precedenza M reg., W, E, B?, è stata accertata come nidificante nella Palude di Colfiorito (PG) con almeno una coppia che si è riprodotta nelle stagioni 2001 e 2002 (Puglisi, com. pers.).

#### **Falconidae**

*Falco naumanni* Fleisher, 1818  
(Grillaio) M reg.

Considerata in precedenza M irr. Dal 1995 al 2002 è stata osservata in Umbria settentrionale quasi ogni anno in aprile, giugno, agosto e settembre (Paci, 2003).

*Falco columbarius* Linnaeus, 1758  
(Smeriglio) M reg., W

Considerata in precedenza M. reg., W irr. Dal 1995 al 2002 è stata osservata quasi ogni anno in

dicembre-gennaio, con uno-due individui in caccia sulle colline intorno a Gubbio (PG), sopra i canneti del Lago Trasimeno (PG) e presso la Palude di Colfiorito (PG). Di recente (2001-2002) ha sostato nell'Oasi di Alviano (TR).

*Falco eleonora* Géné, 1839  
(Falco della regina) M irr.

Riportata in precedenza come A4. La recente osservazione di due individui (almeno uno in fase scura) in volo sulle campagne di Umbertide (PG) e Gubbio (PG), rispettivamente il 5.VI.1997 e nel giugno 2000, farebbe pensare ad una presenza maggiormente regolare della specie rispetto a quanto fino ad oggi registrato.

#### **Rallidae**

*Porzana parva* (Scopoli, 1769)  
(Schiribilla) M reg., E, B?

Considerata in precedenza M reg., E irr. Dal 1997 viene registrata la presenza di una-due coppie nel Lago Trasimeno (PG), in ambienti e periodi adatti alla riproduzione (Muzzatti & Velatta, 1998; Velatta, 2002).

*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)  
(Pollo sultano) A2

Riportata in precedenza come A1. Nelle collezioni dell'ex Museo di Storia Naturale di Perugia figurano due esemplari raccolti alla fine dell'ottocento presso Foligno (PG), forse nella Palude di Colfiorito. La presenza della specie nella località non è stata successivamente confermata.

#### **Recurvirostridae**

*Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)  
(Cavaliere d'Italia) M reg., B irr.

Considerata in precedenza M reg., B. In Umbria il Cavaliere d'Italia si riproduce irregolarmente solo nella provincia di Perugia, presso lo stagno venatorio di San Romano (Paci *et al.*, 1995; Magrini & Gambaro, 1997; Paci, 1999) e nel lago Trasimeno (Velatta, 2002). In queste aree la nidificazione è subordinata alla maggiore o minore quantità d'acqua tra marzo e giugno. La recente presenza di due-tre coppie nell'Oasi di Alviano (TR) durante il periodo estivo, senza tuttavia segni evidenti di nidificazione, fa supporre che la specie si stia diffondendo ulteriormente nella regione.

*Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758  
(Avocetta) M reg., W irr.

Considerata in precedenza M reg. Un individuo ha sostato nell'Oasi di Alviano (TR) per buona parte dell'inverno 1998-1999 (Laurenti, 1998).

**Burhinidae**

*Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758)  
(Occhione) M irr., W irr.?

Considerata in precedenza M irr. Un individuo è stato rinvenuto nei dintorni di Terni il 13.XII.1998 (Laurenti, 1998).

**Charadriidae**

*Charadrius dubius* Scopoli, 1786  
(Corriere piccolo) M reg., B irr.

Considerata in precedenza M reg., B. Sono note nidificazioni nella parte settentrionale della regione, all'interno di impianti attivi e dismessi per l'estrazione o la produzione di inerti (Magrini & Gambaro, 1997; Gaggi et al., 1998), consecutivamente tra il 1988 e il 1994. L'ultimo caso di nidificazione accertato nella regione è quello avvenuto presso lo stagno venatorio di San Romano (PG) nella primavera 1999. Da quella data in poi sono stati osservati solo adulti, rinvenuti comunque in piena stagione riproduttiva lungo corsi d'acqua o all'interno di cave delle province di Perugia e di Terni.

*Hoplopterus spinosus* (Linnaeus, 1758)  
(Pavoncella armata) A1

Un individuo ha sostato diversi giorni nell'Oasi di Alviano (TR) durante il marzo 1999 (Laurenti, 1998). Si tratta del secondo avvistamento confermato per l'Italia. Un altro esemplare della specie, verosimilmente lo stesso, è stato osservato nei pressi del lago Trasimeno (PG) nell'aprile 1999 (Bricchetti et al., 1999).

**Scolopacidae**

*Calidris temminckii* (Leisler, 1812)  
(Gambecchio nano) A1

Quattro individui hanno sostato qualche giorno presso il lago di San Liberato (TR) nell'agosto 2000, quando, a causa di lavori, l'alveo si presentava come una vasta distesa di limo.

*Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)  
(Chiurlo piccolo) A2

Riportata in precedenza come A1. Si ha notizia del rinvenimento di un secondo individuo avvenuto circa venticinque anni fa al lago Trasimeno (PG) (Mallone, com. pers.).

**Stercorariidae**

*Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)  
(Stercorario mezzano) A1

Un adulto è stato osservato in località Fighille (PG), nei pressi dello stagno venatorio di San Romano, durante la prima decade di novembre 2002 (Rovati &

Tani, com. pers.)

**Laridae**

*Larus argentatus* Pontoppidan, 1763  
(Gabbiano reale nordico) A2

Riportata in precedenza come A1. Sono stati osservati alcuni individui nel Lago di Corbara (TR) nel gennaio 2002, durante i censimenti invernali dell'avifauna acquatica (Laurenti & Gustin, oss. pers.).

**Sternidae**

*Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811)  
(Mignattino piombato) M reg., W irr., E irr.

Considerata in precedenza come M reg., W irr. La presenza estiva di singoli individui è stata segnalata da Velatta (2002) al Lago Trasimeno (PG) nelle stagioni 1998 e 1999.

**Strigidae**

*Otus scops* (Linnaeus, 1758)  
(Assiolo) SB, M reg., W

Considerata in precedenza B, W irr., da qualche anno viene regolarmente rilevata durante l'inverno in varie località della provincia di Terni.

**Apodidae**

*Apus melba* (Linnaeus, 1758)  
(Rondone maggiore) M reg, B

Considerata in precedenza M reg, E irr., è stata rinvenuta nidificante intorno ai 1000 metri sul versante umbro del M. Catria (PG) e sul massiccio del Coscerno-Aspra (PG) (Magrini & Gambaro, 1997).

**Hirundinidae**

*Hirundo daurica* Linnaeus, 1771  
(Rondine rossiccia) M reg.

Riportata precedentemente come A2. Dal 1999 viene regolarmente segnalata in località San Liberato e Alviano (TR) durante le migrazioni.

**Sylviidae**

*Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845)  
(Cannaiola di Jerdon) A1

L'individuo catturato nella Palude di Colfiorito (PG) in data 1.IX.2001, durante una campagna di inanellamento, rappresenta l'undicesima segnalazione per l'Italia della specie (Brunelli & Sorace, 2001).

*Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798)  
(Cannaiola verdognola) M reg, E, B?

Considerata in precedenza come M reg., (E), B?. Nel periodo 1998-2002 sono stati rinvenuti singoli maschi in canto su *Salix* spp. nelle seguenti località della provincia di Perugia: Laghi Colombari (Città di

Castello), 23.V.1998 e 8.VI.1998; cave di Pietrafitta (Piegaro), 25.VI.2001; Sant'Arcangelo sul Trasimeno (Magione), 14.VIII.2001; dintorni di Deruta, VI.2001 e VI.2002.

*Sylvia conspicillata* Temminck, 1820  
(Sterpazzola di Sardegna) M irr., B?

Considerata in precedenza M irr. Alcuni individui sono stati rinvenuti nidificanti nell'Appennino marchigiano (Renzini, com. pers.). Non è da escludere la possibile riproduzione della specie anche in aree contigue idonee del versante umbro.

#### Laniidae

*Lanius excubitor* Linnaeus, 1758  
(Averla maggiore) M reg., W

Considerata in precedenza come M. reg., W irr. Dal 1998 al 2002 alcuni individui hanno sostato nel periodo invernale nei pressi del Lago Trasimeno (PG), precisamente nell'Azienda Faunistico Venatoria di Montemelino (Paci, 2000) e presso l'aeroporto di Castiglione del Lago (Velatta, com. pers.). Nella prima stagione, dov'è stata seguita nelle stagioni 1998-1999 e 2000-2001, quest'averla ha mostrato preferenze per le zone aperte di campagna dove ha predato insetti degli ordini Odonata (Zygoptera), Coleoptera (Carabidae, Elateridae, Scarabeidae, Staphylinidae, Chrysomelidae) e Hymenoptera (Vespidae), uccelli di piccole dimensioni (Prunellidae, Turdidae, Sylviidae, Passeridae, Fringillidae, Emberizidae) e micro-mammiferi (Soricidae, Microtidae, Muridae).

#### Passeridae

*Petronia petronia* (Linnaeus, 1766)  
(Passera lagia) SB, M reg., W

Considerata precedentemente M irr., B?, ne è stata accertata nel 1996 la nidificazione sull'Appennino nursino (PG), all'interno di abitazioni abbandonate situate in aree agricole altocollinari intervallate da boschi di Roverella (Magrini & Gambaro, 1997). Successive indagini ne hanno confermato la presenza in inverno. La popolazione è stata stimata in 30-50 coppie e sembra in declino per varie cause (competizione con specie simili, riduzione dell'habitat, bracconaggio).

#### Specie introdotte

*Cygnus atratus* (Latham, 1790)  
(Cigno nero)

Un individuo giovane, forse proveniente dalle popolazioni che si riproducono ormai regolarmente in Italia settentrionale, ha sostato da fine febbraio ai primi di aprile 2001 in provincia di Terni, nel Lago di San Liberato (Laurenti, 2000).

*Alectoris barbara* (Bonnaterre, 1792)  
(Pernice sarda),

Un maschio, affiancato da una femmina di Pernice rossa, *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758), è stato osservato nel maggio e nel giugno 2002 nei dintorni di Camporeggiano (PG). Pochi anni prima, nella stessa zona erano state tentate introduzioni della specie a scopo venatorio.

#### Specie afulghe

*Pelecanus rufescens* Gmelin, 1789  
(Pellicano rossiccio)

Due individui sono stati osservati per la prima volta nell'Oasi di Alviano (TR) nel novembre 2001. Un singolo individuo ha poi stazionato ancora ad Alviano dal settembre al dicembre 2002.

*Platalea alba* Scopoli, 1786  
(Spatola africana)

Un individuo ha stazionato nell'Oasi di Alviano (TR) dal novembre 1997 al marzo 1998.

*Balearica regulorum* (Bennet, 1834)  
(Gru coronata)

Comparsa quasi simultaneamente al Pellicano rossiccio presso l'Oasi di Alviano (TR) nel settembre 2002, vi ha sostato almeno fino al gennaio successivo.

*Columba guinea* Linnaeus, 1758  
(Colomba di Guinea)

Durante la primavera 1996 un maschio ha sostato diverso tempo nei dintorni di Cenerente (PG), temporaneamente associato con alcuni esemplari di Piccione domestico (*Columba livia* Gmelin, 1789) allevati all'interno di un complesso rurale (Paci et al., 1996).

#### DISCUSSIONE

Al termine della nostra revisione le specie di uccelli segnalate per l'Umbria, tra la seconda metà del secolo XIX e il dicembre 2002, sono risultate 336, includendo anche quelle alloctone introdotte senza esito o sfuggite alla cattività.

#### RINGRAZIAMENTI

Hanno fornito materiale e informazioni Gino Bellezza, Walter Bittoni, Luca Convito, Sergio Gentili, Luigi Mallone, Massimo Migliorati, Luca Puglisi, Francesco Renzini, Carmine Romano, Marco Rovati, Giorgio Tani e Francesco Velatta.

#### BIBLIOGRAFIA

BENCIVENGA G., 2001. Accertata nidificazione di Nitticora *Nycticorax nycticorax*, Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*, Airone cenerino *Ardea cinerea* nella Palude di Colfiorito (Umbria). *Picus* 27: 29-30.

- BRICHETTI P., ARCAMONE E., 1999. Comitato di omologazione Italiano (C.O.I.) 14. *Rivista Italiana di Ornitologia* **69**: 211-214.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1998. Checklist degli Uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Rivista Italiana di Ornitologia* **68**: 129-152.
- BRUNELLI M., SORACE A. (eds), 2001. Avvistamenti e comportamenti insoliti. *Alula* **8**: 101-106.
- GAGGI A., PACI A.M., STARNINI L., 1998. La comunità ornitica dei Laghi Colombari (Città di Castello - PG). *Picus* **24**: 13-19.
- LAURENTI S., 1995. Nidificazione di Moretta tabaccata *Aythya nyroca* al lago di Alviano (TR). *Gli Uccelli d'Italia* **20**: 46-47.
- LAURENTI S., 1998. Note su alcune presenze invernali nella provincia di Terni. *Gli Uccelli d'Italia* **23**: 12-13.
- LAURENTI S., 2000. Presenza di Cigno nero *Cygnus atratus* al Lago di San Liberato (TR). *Gli Uccelli d'Italia* **25**: 77-78.
- LAURENTI S., PACI A.M., STARNINI L., 1995. Checklist degli Uccelli dell'Umbria. *Gli Uccelli d'Italia* **20**: 3-20.
- MAGRINI M., GAMBARO C. (eds), 1997. *Atlante Ornitologico dell'Umbria*. Regione dell'Umbria, Città di Castello, 240 pp.
- MUZZATTI M., VELATTA F., 1998. Probabile nidificazione di Schiribilla *Porzana parva* al Lago Trasimeno (Perugia). *Rivista Italiana di Ornitologia* **68**: 115-116.
- PACI A.M., 1999. L'importanza delle zone umide artificiali per la conservazione e lo studio dell'avifauna: l'esempio dello stagno venatorio di San Romano (Perugia-Arezzo). Atti del X Convegno Italiano di Ornitologia. *Avocetta* **23**: 67.
- PACI A.M., 2000. Lo svernamento dell'Averla maggiore *Lanius excubitor* in Umbria (Italia centrale). *Gli Uccelli d'Italia* **25**: 58-68.
- PACI A.M., 2003. La migrazione del Grillaio *Falco naumanni* in Italia: brevi dall'Umbria. *Gli Uccelli d'Italia* **28**: 81-82.
- PACI A.M., GAGGI A., STARNINI L., 1995. Nidificazioni interessanti nell'alto Tevere umbro. *Gli Uccelli d'Italia* **20**: 40-42.
- PACI A.M., GAGGI A., STARNINI L., 1996. Colomba di Guinea *Columba guinea* nel perugino. *Gli Uccelli d'Italia* **21**: 82-83.
- VELATTA F., 2002. *Atlante degli uccelli nidificanti nel comprensorio del Trasimeno (1989-1998)*. I quaderni della Valle, 3. Legambiente Umbria, Fondazione Ca.Ri.Pe, Provincia di Perugia, Città di Castello, 144 pp.
- VELATTA F., BENCIVENGA G., 2002. Nidificazione di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* al Lago Trasimeno (Perugia-Umbria). *Rivista Italiana di Ornitologia* **72**: 92-94.

#### INDIRIZZI DEGLI AUTORI

##### **Stefano Laurenti**

Via della Palazzetta 6, I-05020 Montoro (TR)

e-mail: stefanol@inwind.it

##### **Andrea Maria Paci**

Provincia di Perugia, Servizio Programmazione e Gestione Faunistica

Via Palermo 21/c, I-06100 Perugia

e-mail: angigaggi@libero.it